



meBOR-5 plus

Tüm meyve ve sebzelerde kullanılabilir. Meyve tutumunu kuvvetlendirir, dökülmeyi önler. Çiçeklerin açma sürelerini ve polenlenme dönemini uzatarak, dayanımlarını artırır. Bol çiçek açtırır, yüksek döllenme sağlar.

Garanti Edilen İçerik	: w/w
Toplam Azot (N)	: 4
Üre Azotu (N-NH ₂)	: 4
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: 15
Suda Çözünür Bor (B)	: 5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 5

1
lt

5
lt

20
lt

 BİTKİ	 UYGULAMA ZAMANI	DOZ CC / 100 lt SU İLE	DOZ KG / DA
Zeytin	1: Çiçeklenme öncesi 2: Çiçeklenmeden sonra 3: İkinci uygulamadan 30-40 gün sonra	300 cc	1-1,5 kg
Fındık, Ceviz, Badem	1: Yaprak çıkışı gözleendiğinde 2: Meyve tutum başlangıcında	300 cc	1-1,5 kg
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Şeftali, Nar)	1: Yaprak oluşumundan hasat dönemine kadar 2: Hasat sonundan yaprak dökümüne kadar	300 cc	1-1,5 kg
Sebzeler	Bitki 4-6 yapraklı olduğunda ilk uygulama yapılır ve hasada 15 gün kalana kadar sürdürülebilir.	150 - 200 cc	1-1,5 kg
Üzüm ve Bağlarda	1: Yaprak çıkışı gözleendiğinde 2: Dane tutumunda	300 cc	1-1,5 kg
Tarla Bitkileri	Aktif gelişme dönemi boyunca	200 cc	1-1,5 kg
Pamuk	1: Bitki boyu 10-15 cm olduğunda 2: Tarak oluşumunda	200 cc	1-1,5 kg
Şekerpancarı, Ayçiçeği, Mısır	1: Bitki boyu 10-15 cm olduğunda 2: Birinci uygulamadan 10 gün sonra	200 cc	1-1,5 kg
Narenciye	1: Beyaz göz döneminde 2: Beyaz gözler ayrıldığında	300 cc	1-1,5 kg
Muz	Meyve oluşum döneminden itibaren	200 cc	1-1,5 kg
Çiçekler, Çim	Yetiştirme dönemi süresince 2 kez	150 - 200 cc	1-1,5 kg