



MUZ

	UYGULAMA ZAMANI	DOZ Yapraktan cc/100 lt su ile	DOZ Damladan topraktan kg/da
meBOR 5	1. uygulama: Çiçeklenmeden önce 2. uygulama: Birinci uygulamadan 15 gün sonra	200 cc	400-500 cc
meBOR2+Cu	Bakır takviyeli bor-çinko uygulaması istendiğinde. 1. uygulama: Çiçeklenme öncesi 2. uygulama: Birinci uygulamadan 15 gün sonra	200 cc	400-500 cc
meBOR-CaZ	Meyve tutumundan sonra 2-3 uygulama	100 gr	
BEREKET	İhtiyaç durumunda	200 cc	1-2 lt
meb-17	İhtiyaç durumunda	200 cc	1-2 lt
miEfert	Onarımdan sonra		100 gr/yalak
Limesol	Su ph sı dengelenmek istendiğinde	100 cc	1 lt
N-Sülfasit	Toprak ph sı yükseldiğinde		1-2 lt
günebakan	Meyve tutum sonrası	300-400 gr/da	400-500 gr
narince	Meyve tutum sonrası	450-500 gr	2-3 kg
%10 Zn	Doğum öncesinde	200-250 cc	400-700 cc
Demiraktif	Noksanlık durumunda	100 cc	1-2 lt
mebmangar	Meyve oluşumundan itibaren 10-15 gün ara ile hasata kadar uygulama yapılır	50-70 gr	100 gr
kalsibor KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ	Aktif gelişme dönemi boyunca 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama	200-300 cc	
FOSFOMEB-K	Gelişme dönemi boyunca ve hasat sonrası ihtiyaç doğrultusunda		250-500 gr/ağaç
ÇİNKO SÜLFAT GRANÜL	Gelişme dönemi boyunca ihtiyaç doğrultusunda		3-5 kg/da